

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕЦИДИВНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Э.В. Драньков, Г.С. Авдеев

Научный руководитель – к.м.н., доцент *П.С. Кривонос*
Белорусский государственный медицинский университет

Цель работы: изучить распространенность рецидивов туберкулеза органов дыхания (ТОД) среди осужденных и определить их влияние на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в пенитенциарных учреждениях (ПУ) и в целом по республике.

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ показателей заболеваемости ТОД и рецидивов в ПУ и среди населения республики за десятилетний период (с 1993 по 2002 гг).

Результаты обсуждения: установлены общие закономерности распространения впервые выявленного ТОД как среди всего населения, так и в ПУ. За анализируемый период показатели заболеваемости ТОД увеличились среди населения в 1,6 раза, а в ПУ в 6,4 раза. Максимально высокие показатели были в 1998 году (54,9 по республике и 1658 в ПУ), с последующей стабилизацией их и постепенным снижением. За последние четыре года показатели заболеваемости ТОД среди населения снизились в 1,2 раза, а в ПУ в 1,5 раза. В то время динамика показателя заболеваемости рецидивами ТОД носила отличительный характер. В ПУ заболеваемость рецидивами ТОД имела тенденцию к ежегодному росту и увеличилась в 7,2 раза (с 32,9 в 1993 г. до 237,5 на 100 тыс. осужденных в 2002 г.). В данный период среднереспубликанский показатель заболеваемости рецидивным туберкулезом среди населения республики оставался стабильным и составлял 4,4 – 4,5 на 100 тыс. населения. Следовательно, за последние четыре года показатель заболеваемости ТОД в ПУ превышает среднереспубликанский в 23,8 раза, а рецидивным туберкулезом в 50,9 раза. В условиях ПУ важное значение приобретает показатель заболеваемости рецидивным туберкулезом при расчете его на осужденных, имеющих посттуберкулезные изменения. Данный показатель увеличился за десять лет в 3,5 раза (с 2 007 до 6 996 на 100 тыс. осужденных с посттуберкулезными изменениями). Рост рецидивов в ПУ происходит в основном за счет лиц, недавно перенесших туберкулез (1 – 2 года наблюдения в неактивной группе диспансерного учета). Показатель заболеваемости ранними рецидивами увеличился за десять лет в 11,2 раза (с 18,5 в 1993 г. до 206,2 в 2002 г. на 100 спецконтингента).

Вывод: в ПУ республики при неблагоприятной общей эпидемической ситуации по туберкулезу, возрастает значение рецидивного ТОД. Заболеваемость ТОД осужденных с остаточными посттуберкулезными изменениями в 4 – 7 раз выше, чем среди остальных спецконтингентов ПУ. Рецидивы туберкулеза ПУ формируются за счет лиц недавно перенесших туберкулез, при наблюдении в неактивных группах диспансерного учета 1–2 года.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Г.В. Жук

Научный руководитель – д.м.н., профессор *А.А. Баешко*
Белорусский государственный медицинский университет

Посттромботическая болезнь (ПТБ) — часто встречающаяся (у 20-88% пациентов, перенесших тромбоз глубоких вен) патология, требующая больших затрат на лечение, сопровождающаяся высокой инвалидизацией. Цель работы — оценить результаты консервативного и хирургического лечения больных с ПТБ.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты лечения 46 больных (30 женщин, 16 мужчин) с ПТБ. Отек нижних конечностей наблюдался у 41 (89%) больного, тупые боли в ногах — у 32 (69,5%), индурация и пигментация тканей голени с признаками липодерматосклероза — у 12 (26%), трофические язвы голени — у 5 (10,9%) больных.

Консервативное лечение, включавшее постельный режим, возвышенное положение нижней конечности, диуретическую терапию и ношение компрессионного трикотажа, проводилось